

LA PREVENCIÓN DEL AIDS

La terapia del AIDS ha permitido de salvar muchas vidas humanas, mas no es en grado de eliminar el virus, si bien es cierto disminuye el peligro de volver a contagiarse y por lo tanto a desarrollar nuevamente la enfermedad.

Para contrastar la difusión del virus HIV y del AIDS la única verdadera arma es la prevención.

Es importante:

- evitar el uso de drogas por vía intravenosa o por vía oral (como el ecstasy) u otra vía.
- limitarse el uso de alcohol.


Tales sustancias, bajan el estado de ánimo y de autostima y de “safe-sex”, facilitando el comportamiento a riesgo.

- evitar el cambio de aguja y jeringas de reporte sexual sin protección reporte sin protección.

El uso del profiláctico está demostrado de ser una eficaz modalidad para evitar la transmisión sexual.

“El AIDS es, en gran parte ligado a la droga y a la actividad sexual deliberada .

Si se elimina la primera y tendremos responsable la segunda, se podrá eficazmente limitar la difusión de (contaminación) de esta grave enfermedad” (prof. LUC Montagnier descubridor del virus HIV)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

**PROGRAMA PREVENCIÓN
HIV-AIDS & MST
COMISION HIV-AIDS&MST
EDUCACION PARA LA SALUD
DIRECCION SANITARIA AZIENDALE**

CUT AIDS !!!



CORTEMOS EL AIDS

QUÉ COSA ES EL AIDS

AIDS es una sílaba (acquired inmunodeficiente síndrome) que indentifica una enfermedad del sistema inmunitario causada de un virus (HIV-HUMAN-INMUNO DEFICIENTE VIRUS).

Tal agente infeccioso es en grado de destruir progressivamente las células (linfocitos CD4 – Helper) de la defensa inmunitaria, por tanto quien contrar éste virus se vuelve con el pasar del tiempo, inmunológico deprimido y es expuesto a enfermedades e infecciones que, generalmente no golpean a las personas inmunocompetentes.

Cuando una persona entra en contacto con el virus HIV no se encuentran de inmediato manifestaciones clínicas específicas, por lo tanto, por un largo período de tiempo (de algunos meses hasta algunos años) el único método para saber si un sujeto es infectado queda la ejecución del test.

Para la búsqueda de los anticuerpos anti HIV.

La presencia de tales anticuerpos sin síntomas se define « ceropositividad » el AIDS, en ausencia de terapia específica, es una enfermedad mortal.

En los últimos años los decesos por AIDS son batidos gracias al uso siempre más amplio de fármacos en grado de truncar el desarrollo de la enfermedad viral, disminuyendo así la evolución de la enfermedad.

Por lo tanto estos fármacos no son capaces de eliminar el virus, por lo cual no existe todavía la posibilidad de curar (total o definitivamente).

TEST DEL HIV

La determinación del estatus serológico es el modo más simple para saber si está contaminado del virus HIV. El test es un examen altamente sensible y específico y consiste en una simple extracción de sangre en la cual viene buscada la presencia de anticuerpos contra el virus HIV.

Cabe recordar que tal test se vuelve positivo después de 20- 30 días de ser contagiado, este sería el tiempo medio en el cual nuestro organismo produce los anticuerpos. Tal período (llamada fase ventana) impone que el test no venga efectuado de inmediato después de la eventual exposición a riesgo, mas al menos, después de 3 y 6 meses.

Es oportuno que se someta al test:

- ❑ Quien ha tenido reportes sexuales en forma deliberada o sea sin protección o como sea a riesgo.
- ❑ Quien ha cambiado jeringa o instrumento para el uso de droga.
- ❑ Las mujeres al inicio del embarazo

Quanto antes se viene a saber de estar contagiado, tanto antes se puede iniciar el tratamiento y poner en práctica la precaución y seguridad respecto a otras personas (por ejemplo su pareja sexual).

Cualquier laboratorio está en grado de efectuar el test.

**Si quieres usar gratis y/o anonimo y/o consejos puedes dirigirte al ambulatorio
U.O. ENFERMEDADES INFECTIVAS
HOSPITAL “GUGLIELMO DA SALICETO”
Via Taverna 49 Piacenza
DE LUNES A VIERNES DE LAS 12 A LA 14**