

Il donatore straniero  
e i viaggiatori internazionali.

## Доноры иностранцы и люди, путешествующие по всему миру.

Руководство для доноров крови.

Для более эффективного контроля всего того, что относится к инфекционным заболеваниям, передаваемым через кровь, а так же для отбора доноров из числа эмигрантов и людей, путешествующих по всему миру, на региональном уровне были сделаны новые предписания, включающие анкеты для различных выявлений и которые должны заполняться периодически.

Был составлен список стран с наибольшим уровнем распространения заболеваний как тропического типа, так и при помощи различного типа паразитов.

### **Malaria**

#### **Малярия.**

В каждом центре по переливанию крови, должна быть в наличии карта с указанными на ней зонами риска по эндемии малярии и относящимся к ней списком стран.

#### **Этиология:**

Протозой типа Plasmodium.

#### **Носитель:**

Самка комара типа Anopheles.

#### **Способ заражения:**

Укус зараженного комара.

#### **Инкубационный период:**

От нескольких дней до нескольких лет.

#### **Симптомы:**

Различные, в основном в виде повышения температуры, головной боли, боли в мышцах и симптомы, напоминающие простудные, анемия, пожелтение кожи.

#### **Прогноз:**

Даже смертельный исход, в зависимости от типа плазмодия и того, как он реагирует на антималярийные препараты, от того как быстро и правильно был поставлен диагноз и проведено лечение, а так же от физического состояния больного.

#### **Зоны риска:**

Центральная и южная Америка, Африка тропическая и экваториальная, Ближний Восток, Юго-восточная Азия, Средиземноморье.

#### **Меры предосторожности для доноров:**

- временное прекращение донорской деятельности сроком на 6 месяцев после возвращения из зоны риска для тех людей, которые не имели каких-либо симптомов с повышением температуры и без проведения профилактики.
- временное прекращение донорской деятельности сроком на 3 года для людей, проводящих профилактику
- полное устранение на 3 года людей, эмигрированных из зон риска.

**Febbre gialla**  
**Желтая лихорадка**

**Этиология:**

Flavivirus

**Vettore:**

**Носитель:**

комар aedes aegypti

**Способ заражения:**

Распространителями инфекции в джунглях являются комары (климатические условия джунглей этому способствуют) и некоторые приматы.

Человек, укушенный инфицированным комаром, является носителем данной инфекции и тем самым способствует распространению этой инфекции на других комаров, любой другой зоны, например городской.

**Инкубационный период:**

От 3 до 6 дней.

**Симптомы:**

Высокая температура, озноб, покраснение лица, головная боль, тошнота, рвота, боль в суставах и мышцах, проstration в тяжелой форме.

После чего появляется лейкопения и кровотечение.

Пожелтение кожи постепенное.

Заболевание может привести к альбуминии и в более тяжелых случаях анурии.

**Зоны риска:**

Эндемическая в центральной Африке и южной Америке.

**Прогноз:**

низкая смертность около 10%.

**Меры предосторожности для доноров:**

Вакцинация и временное прекращение донорской деятельности сроком на 6 месяцев.

По таким заболеваниям, как :

**Тиф сыпной (Tifo esantematico)**

**Тиф (Tifo murino)**

**Лихорадка (Febbre di Lassa)**

**Трахома и болезнь Лайма (Tracoma e malattia di Lyme)**

**Меры предосторожности для доноров:**

Прекращение донорской деятельности на последующие 6 месяцев после выздоровления.

По таким заболеваниям, как :

**Tripanosmiasi**

**Leishmaniosi**

**Febbre Q**

**Babesios**

**Filariosi**

**Меры предосторожности для доноров:**

Полное прекращение донорской деятельности, непригодность постоянная.

По таким заболеваниям, как :

**Энцефалит японский (Encefalite giapponese)**

**Schistosomiasi o Bilargiosi**

**Меры предосторожности для доноров:**

Прекращение донорской деятельности на последующие 2 года после выздоровления.

**Dengue**

**Меры предосторожности для доноров:**

Прекращение донорской деятельности на 6 месяцев в случае заболевания и допуск, после прохождения всех анализов на инфекцию.

**Лихорадка Эбола (Febbre di Ebola (virus della famiglia delle filoviridae))**

**Меры предосторожности для доноров:**

Прекращение донорской деятельности на 6 месяцев в случае заболевания и допуск, после прохождения всех анализов на инфекцию.

